

NHOフォーミュラー一覧

① PPI/Pcab剤 (内服薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 胃潰瘍 (GU)	ランソプラゾールOD錠 (小児はエソメプラゾールMg水和物のみ適応)	エソメプラゾールMg水和物Cp ボノプラザンフマル酸塩錠
2 十二指腸潰瘍 (DU)		
3 逆流性食道炎		エソメプラゾールMg水和物Cp
4 吻合部潰瘍		
5 Zollinger-Ellison症候群		
6 非びらん性胃食道逆流症		
7 低アスピリン投与時のGU, DUの再発抑制	ランソプラゾールOD錠	エソメプラゾールMg水和物Cp ボノプラザンフマル酸塩錠
8 NSAIDs投与時におけるGU, DUの再発抑制		

なお、簡易懸濁不可かつ散剤での投与が必要な場合のみ、エメプラゾールMg水和物懸濁用顆粒剤を使用。

② スタチン剤

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 高脂血症	プラバスタチンナトリウム錠	
2 高コレステロール血症	ロスバスタチン錠 (10歳以上の小児はピタバスタチン錠のみ適応)	ピタバスタチンカルシウム錠 アトルバスタチン錠
3 家族性高コレステロール血症		

③ フィブレート系高脂血症薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高脂血症	ベザフィブレート徐放錠 フェノフィブレート錠	ペマフィブレート錠

④ H2遮断内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・逆流性食道炎	ファモチジン錠・OD錠 (散剤投与が必要な場合： ファモチジン散)	ラフチジン錠 ニザチジン錠
2 胃炎・慢性胃炎の急増悪期の胃粘膜病変 (びらん・出血・発赤・浮腫) の改善		
3 吻合部潰瘍		ラフチジン錠
4 上部消化管出血・Zollinger-Ellison症候群		
5 麻酔前投薬	ラフチジン錠	

⑤ 尿酸生成阻害薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 痛風	フェブキソスタット錠	トピロキソスタット錠
2 高尿酸血症	アロプリノール錠	
3 がん化学療法に伴う高尿酸血症	フェブキソスタット錠	

⑥ 降圧薬 (ARB)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 高血圧症	オルメサルタン錠・OD錠 テルミサルタン錠・OD錠 カンデサルタン錠・OD錠 (1歳以上の小児は、 カンデサルタン錠・OD錠)	アジルサルタン錠
2 腎実質性高血圧症	カンデサルタン錠・OD錠	
3 ACE阻害薬投与が適切でない慢性心不全		
4 高血圧及び蛋白尿を伴う2型DMのDM性腎症	ロサルタンカリウム錠	

⑦ 降圧薬 (ACE阻害薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 (本態性) 高血圧症	エナラプリルマレイン酸塩錠 (散剤投与が必要な場合： エナラプリルマレイン塩細粒1%)	イミダプリル塩酸塩錠 ペリンドプリルエルブミン錠 イミダプリル塩酸塩錠
2 腎性高血圧症		
3 腎血管性高血圧症		
4 悪性高血圧症		
5 慢性心不全		
6 糖尿病性腎症 (I型糖尿病)		イミダプリル塩酸塩錠

⑧ ビスホスホネート製剤内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	第三選択薬
骨粗鬆症	アレンドロン酸錠35mg (週1回投与)	リセドロン酸Na錠17.5mg (週1回投与)	ミノドロン酸錠50mg (4週1回投与)

・錠剤での服用が困難な場合のみ、アレンドロン酸経口ゼリー35mgを使用。

⑨ 糖尿病薬 (α-グルコシダーゼ阻害薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 糖尿病の食後過血糖の改善	ボグリボース錠・OD錠	ミグリトール錠・OD錠 アカルボース錠・OD錠
2 耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	ボグリボース錠・OD錠	

⑩ 糖尿病薬 (グリニド系薬)

効能効果	第一選択薬	第二選択薬
2型糖尿病	レパグリニド錠 ミチグリニドCa・OD錠	ナテグリニド錠