

NHOフォーミュラー一覧

① PPI/Pcab剤(内服薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 胃潰瘍(GU)	ランソプラゾールOD錠 (小児はエソメプラゾールMg水和物のみ 適応)	エソメプラゾールMg水和物Cp ボノプラザンフマル酸塩錠
2 十二指腸潰瘍(DU)		
3 逆流性食道炎		エソメプラゾールMg水和物Cp
4 吻合部潰瘍		
5 Zollinger-Ellison症候群	ランソプラゾールOD錠	エソメプラゾールMg水和物Cp ボノプラザンフマル酸塩錠
6 非びらん性胃食道逆流症		
7 低アスピリン投与時のGU,DUの再発抑制		
8 NSAIDs投与時におけるGU,DUの再発抑制		

なお、簡易懸濁不可かつ散剤での投与が必要な場合のみ、エメプラゾールMg水和物懸濁用顆粒剤を使用。

② スタチン剤

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 高脂血症	プラバスタチンナトリウム錠	
2 高コレステロール血症	ロスバスタチン錠 (10歳以上の小児はピタバスタチン錠の み適応)	ピタバスタチンカルシウム錠 アトルバスタチン錠
3 家族性高コレステロール血症		

③ フィブラート系高脂血症薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高脂血症	ベザフィブラート徐放錠 フェノフィブラート錠	ペマフィブラート錠

④ H2遮断内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・逆流性食道炎	ファモチジン錠・OD錠 (散剤投与が必要な場合: ファモチジン散)	ラフチジン錠 ニザチジン錠
2 胃炎・慢性胃炎の急増悪期の胃粘膜病変(びらん・ 出血・発赤・浮腫)の改善		ラフチジン錠
3 吻合部潰瘍		
4 上部消化管出血・Zollinger-Ellison症候群		
5 麻酔前投薬	ラフチジン錠	

⑤ 尿酸生成阻害薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 痛風	フェブキソスタット錠 アロプリノール錠	トピロキソスタット錠
2 高尿酸血症		
3 がん化学療法に伴う 高尿酸血症	フェブキソスタット錠	

⑥ 降圧薬(ARB)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 高血圧症	オルメサルタン錠・OD錠 テルミサルタン錠・OD錠 カンデサルタン錠・OD錠 (1歳以上の小児は、 カンデサルタン錠・OD錠)	アジルサルタン錠
2 腎実質性高血圧症	カンデサルタン錠・OD錠	
3 ACE阻害薬投与が適切でない慢性心不全		
4 高血圧及び蛋白尿を伴う 2型DMのDM性腎症	ロサルタンカリウム錠	

⑦ 降圧薬(ACE阻害薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 (本態性)高血圧症	エナラプリルマレイン酸塩錠 (散剤投与が必要な場合: エナラプリルマレイン塩細粒1%)	イミダプリル塩酸塩錠 ペリンドプリルエルブミン錠 イミダプリル塩酸塩錠
2 腎性高血圧症		
3 腎血管性高血圧症		
4 悪性高血圧症		
5 慢性心不全		
6 糖尿病性腎症(I型糖尿病)		イミダプリル塩酸塩錠

⑧ ビスホスホネート製剤内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬	第三選択薬
骨粗鬆症	アレンドロン酸錠35mg (週1回投与)	リセドロン酸Na錠17.5mg (週1回投与)	ミノドロン酸錠50mg (4週1回投与)

・錠剤での服用が困難な場合のみ、アレンドロン酸経口ゼリー35mgを使用。

⑨ 糖尿病薬(α-グルコシダーゼ阻害薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1 糖尿病の食後過血糖の改善	ボグリボース錠・OD錠	ミグリトール錠・OD錠 アカルボース錠・OD錠
2 耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	ボグリボース錠・OD錠	

⑩ 糖尿病薬(グリノド系薬)

効能効果	第一選択薬	第二選択薬
2型糖尿病	レバグリノド錠 ミチグリノドCa・OD錠	ナテグリノド錠

⑪ ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬(成人高血圧症)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高血圧症	アムロジピンOD錠 ニフェジピンCR錠	ベニジピン錠 シルニジピン錠 アゼルニジピン錠

⑫ 第2世代抗ヒスタミン内服薬(成人 アレルギー性鼻炎、蕁麻疹等皮膚疾患)フォーミュラー

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
アレルギー性鼻炎、蕁麻疹等皮膚疾患	フェキソフェナジン塩酸塩錠・OD錠 (特徴:眠気が弱い) エビナスチン塩酸塩錠 (特徴:1日1回投与) レボセチリジン塩酸塩錠・OD錠 (特徴:効果発現が早く、1日1回投与だが、 CCrに応じて投与量の調節が必要) オロパタジン塩酸塩錠・OD錠 (特徴:効果発現が早い1日2回朝及び就寝前投与)	ピラスチン錠・OD錠 (特徴:効果発現が早く、眠気が弱いが、 空腹時投与) デスロラタジン錠 (特徴:食事の影響を受けにくく、ピラスチンより安価)